



重点场所 疫情防控指引（一）

落实“四早”

- 早发现
- 早报告
- 早隔离
- 早治疗

各地要指定发热门诊、定点收治医院开展发热病人筛查，及时诊断并隔离治疗新冠肺炎病例，做到“应检尽检”、“应收尽收”、“应治尽治”，防漏诊、误诊，防止轻症转重症。

社区



未发现病例的社区——

重点地区和高风险地区员应当立即登记，集中或居家14天。



出现病例或暴发疫情的社区——

做好病例家庭、楼栋单元、单位办公室、会议室等疫点的消毒，以及公共场所清洁消毒。

出现疫情传播的社区——

对划为疫区的社区，必要时可采取疫区封锁措施，限制人员进出，临时征用房屋、交通工具等。

限制人员聚集，关闭公共浴池、温泉、影院、网吧、商场等公共场所。

必要时停工、停业、停课。

提供居民健康指导，为老人、儿童、慢性病患者等特殊人群，提供24小时电话或者线上咨询服务。为独居或行动不便者，提供必要的上门医疗服务。

办公场所

每日健康监测——

建立体温监测登记本。每天上班前对员工进行体温测量。



使用集中空调通风系统时——

应关闭回风，使用全新风运行。

使用电梯——

建议尽量避免乘坐厢式电梯，乘坐时应当佩戴口罩。

减少人员密切接触——

1. 分区作业、分散错峰就餐。
2. 鼓励具备条件的企事业单位采取错时上下班、弹性工作制或居家办公方式。

3. 控制会议频次和规模，会议期间温度适宜时应开窗或开门，建议采用网络视频会议等方式。

设立隔离观察区域——

员工出现可疑症状时应当及时隔离并安排就近就医。

每日健康监测——

建立体温监测登记本。每天上班前对员工进行体温测量。

商场、超市



“进出检”——

在经营场所门口设置专人对每位上岗员工和顾客测量体温，体温正常方可进入。

加强室内通风——

首选自然通风，尽可能打开门窗通风换气。空调通风系统需关闭回风系统。

合理使用电梯——

限制每次乘坐电梯的人数，乘梯时相互之间注意保持适当距离。

缩短时间——

物品尽量提前包装标价。推荐顾客自助购物、自助结算。

卫生间保洁——

使用卫生间时，应当打开排气扇。使用完毕后，应当盖上马桶盖再冲水。

医疗机构



清洁消毒——

加强诊疗环境的通风，也可配备循环风空气消毒设备。

感染检测——

发现疑似或确诊新冠肺炎患者时，应在2小时内上报信

发热门诊：

留观室或抢救室加强通风；如使用机械通风，应当控制气流方向，由清洁侧流向污染侧。

出入口应当设有速干手消毒剂等卫生设施。